

## Plus d'informations

### Ghapro

Verversrui 3, 2000 Anvers  
Tél. 03 293 95 91  
0474 98 57 66

[www.ghapro.be](http://www.ghapro.be)  
[www.infosexwork.be](http://www.infosexwork.be)

### Pasop

Brabantdam 100 b, 9000 Gand  
Tél. 09 233 47 67

Ertbeekstraat 34, 3500 Hasselt  
Tél. 011 33 30 58

[www.pasop.info](http://www.pasop.info)



*Fellation*  
**Fellation  
en toute sécurité**

Editeur responsable: Katleen Peleman  
Illustrations: © Vero Beauprez, tous droits réservés  
[www.verobeauprez.be](http://www.verobeauprez.be)  
Edition décembre 2014

Dit is een vertaling van de Nederlandstalige folder  
'veilig pijpen' naar het Frans.

# Les risques de la fellation

La fellation ne constitue **pas de risque de VIH**, à moins que du sperme entre en contact avec la bouche. Cela constitue un danger pour la personne qui suce.

Elle constitue **un risque pour d'autres infections sexuellement transmissibles (IST)**, telles que la syphilis, l'herpès génital, l'hépatite B, la chlamydia et la gonorrhée. Jouir dans la bouche constitue également un risque de VIH.

**Voilà pourquoi il faut toujours utiliser un préservatif !**

## Saviez-vous que ...

- ☞ La **muqueuse** de votre **gorge** est sensible aux IST ! Voilà pourquoi vous devez éviter que les hommes jouissent dans votre bouche et surtout d'avaler le sperme.
- ☞ Le **liquide pré-éjaculatoire** peut également contenir des bactéries telles que la chlamydia et la gonorrhée. Pour cette raison, il est à conseiller d'utiliser un préservatif dès le début.
- ☞ La **muqueuse** du **pénis** peut être contaminée avec une IST. La syphilis peut être transmise via la muqueuse du pénis. Le risque d'une infection augmente quand vous faites une "fellation profonde" et la muqueuse du pénis touche la muqueuse de votre gorge.
- ☞ Vous courez un risque plus élevé d'une IST si vous avez de petites **plaies** dans la **bouche**. Celles-ci constituent des portes d'entrée directes à votre système sanguin.
- ☞ Ne vous rincez pas la bouche avec de l'eau buccale (p.ex. Listerine). C'est un produit extrêmement agressif qui affecte vos muqueuses.
- ☞ Ne vous brossez pas les dents juste avant ou après la fellation. En vous brossant les dents, vous pouvez causer de petites plaies permettant à l'IST de pénétrer le système sanguin.

Si vous voulez éviter à tout prix une infection, **la meilleure manière de sucer est en utilisant un préservatif.**

## Saviez-vous que ...

- ☞ Il existe des préservatifs aromatisés. Cela rend plus agréable la fellation avec préservatif.
- ☞ Il existe des préservatifs extra fins. Le client sent à peine qu'il porte un préservatif.

## Conseils

- Essayez de **négoier** avec votre client. Ce qui compte le plus pour vous deux, c'est votre santé.
- En suçant avec un préservatif, vous faites la **distinction** entre votre vie **privée** et votre **travail**.
- **Mettez** le préservatif **en utilisant votre bouche**. Cela permet au client de perdre moins facilement son érection.
- **Observez** bien le client et surtout son pénis. Il vaut mieux refuser un client qui a des ampoules, des ulcères ou des verrues dans la zone génitale. Ceux-ci peuvent être le symptôme d'une infection sexuellement transmissible. Même un préservatif ne vous y protège pas assez, parce que la peau dans les plis des aines, des cuisses et des testicules peut aussi être infectée.
- N'oubliez pas que la plupart des **IST** est **invisible** ! Il est toujours possible que quelqu'un ait une infection. L'hygiène N'ÉQUIVAUT PAS à la santé.
- Faites en sorte que ce soyez vous qui avez le **contrôle**. Positionnez-vous au-dessus de votre client afin de contrôler la profondeur et le laps de temps de la fellation. Plus la pénétration du pénis est profonde, plus le risque est grand. Utilisez vos mains comme pare-chocs.

## Avez-vous eu un contact à risque ?

- Essayez de cracher le sperme ou le liquide pré-éjaculatoire dans les plus brefs délais.
- Rincez-vous la bouche à l'eau sans vous gargariser. De cette façon, vous prévenez que le sperme ou le liquide pré-jaculatoire se diffuse dans votre bouche.
- N'utilisez pas d'eau buccale.
- Ne vous brossez pas les dents immédiatement après un contact à risque.

☞ **Demandez à votre médecin de vous faire régulièrement un test de dépistage d'IST. Dans la gorge aussi, la chlamydia et la gonorrhée peuvent être détectées. Pour les autres IST, un test sanguin est nécessaire.**

